

RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE HECES FECALES

PREVIO A LA RECOLECCIÓN


- No aplique cremas, pomadas, aceites o talco.
- No ingiera laxantes o antidiarreicos; si es el caso, suspender 5 días y esperar para recolectar la muestra.
- No hay restricción en cuanto a alimentos o al ayuno.
- Bebés: Inmediatamente después que haya evacuado, tomar la muestra del pañal cómo se indica en el punto 2.

RECOLECCIÓN

1. Recolectar la muestra en un recipiente o superficie limpia, libre de tierra, de agua o de orina.



2. Tome una porción de heces con una cuchara desechable o palita de madera. Coloque la muestra en un recipiente limpio, llene solo una tercera parte del recipiente. Cierre perfectamente.



DEPENDIENDO DEL ESTUDIO QUE REQUIERA, SIGA ESTAS INDICACIONES ADEMÁS DE LAS ANTERIORES:

AMIBA EN FRESCO Y CITOLOGÍA FECAL

- Llevar la muestra al laboratorio **máximo 1 hora** después de recolectada. **No refrigerar.**
- Si observa moco o sangre, tomar preferentemente de esa zona.

COPROPARASITOSCÓPICO, ROTAVIRUS, *Clostridium difficile* TOXINA A Y B+GDH

- De preferencia lleve inmediatamente la muestra, puede refrigerarla hasta por 24 horas.

COPROCULTIVO, CULTIVO DE LOWENSTEIN-JENSEN, BAAR

- Llevar la muestra máximo 1 hora después de recolectada.
- No tomar antibiótico los 5 días previos a la recolección.

COPROLÓGICO Y AZÚCARES REDUCTORES

- De preferencia lleve inmediatamente la muestra, puede refrigerarla hasta por **2 horas.**
- No se recomienda realizar si el paciente esta menstruando y/o presenta hemorroides sangrantes.

SANGRE OCULTA EN HECES

- De preferencia lleve inmediatamente la muestra, puede refrigerarla hasta por 24 horas.
- No se recomienda realizar si el paciente esta menstruando y/o presenta hemorroides sangrantes.

***Helicobacter pylori* ANTÍGENO EN HECES**

- De preferencia lleve inmediatamente la muestra, puede refrigerarla hasta por 24 horas.
- Si está tomando antibiótico y/o antiácidos, es recomendable esperar 2 semanas después de suspender el tratamiento para recolectar su muestra.

CALPROTECTINA Y LACTOFERRINA EN HECES

- De preferencia lleve inmediatamente la muestra, puede refrigerarla hasta por 24 horas.
- No se recomienda realizar si está tomando antiinflamatorios o después de una colonoscopia.

Recepcionista: marcar el estudio que el paciente va a realizarse.